



SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

SEMESTRAL
UNI



Álgebra

Tema: Determinante y matriz inversa

Docente: Gustavo Poma Quiroz

DETERMINANTES

Es una función que, aplicada a una matriz cuadrada, la transforma en un escalar.

Notación

Sea A una matriz cuadrada, el determinante de A se representa por:

$$|A| \text{ o } \text{Det}(A)$$

CÁLCULO DE LA DETERMINANTE

Para matriz de orden 1

$$\text{Si } A = (a) \Rightarrow |A| = a$$

Ejemplos

Para matriz de orden 2

$$\text{Si } M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = ad - bc$$

Ejemplos


Calcule el determinante de las siguientes matrices

$$1. A = \begin{pmatrix} 2023 & 2021 \\ 2025 & 2023 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$2. M = \begin{pmatrix} \text{sen}x & -\text{cos}x \\ \text{cos}x & \text{sen}x \end{pmatrix} \Rightarrow$$

Para matriz de orden 3 (Regla de Sarrus)

Sea $P = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \Rightarrow |P| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$



$$|P| = aei + dhc + gbf - ceg - fha - ibd$$

Ejemplo

Calcule el determinante de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

PROPIEDADES DE LA DETERMINANTE

Sean A y B matrices de orden n .

1. $|I| = 1$ I : matriz identidad

Ejemplos

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

2. $|O| = 0$ O : matriz nula

Ejemplos

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

3. Si una matriz, tiene una fila nula (o columna nula), su determinante es **CERO**.

Ejemplos

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 7 & 0 & 8 \\ -2 & 0 & 10 \\ 1 & 0 & \pi \end{vmatrix} = 0$$

4. Si una matriz tiene dos filas (o columnas) **iguales**, su determinante es **CERO**.

Ejemplos


$$\begin{vmatrix} 6 & 6 & 7 \\ 5 & 5 & 4 \\ 2 & 2 & \sqrt{3} \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 0 & 7 & 9 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & -1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

5. Si una matriz tiene dos filas (o columnas) **proporcionales**, su determinante es **CERO**.

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 5 & 20 & 7 \\ -2 & -8 & 9 \\ 3 & 12 & 1 \end{vmatrix} = 0$$



Por 4

6. El determinante de una **matriz antisimétrica** de orden impar es **CERO**.

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 0 & 4 & -3 \\ -4 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

7. El determinante de una matriz diagonal, triangular (superior o inferior), es igual al producto de los elementos de su diagonal principal.

Ejemplos

1. $\begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 4 \cdot 3 \cdot 6 = 72$

2. $\begin{vmatrix} 1 & 8 & 7 \\ 0 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-5) \cdot 3 = -15$

$$3. \begin{vmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 3 & -7 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \end{vmatrix} = (-4)(-7).2 = 56$$

$$8. |A| = |A^T|$$

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{vmatrix} = 27 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 0 \end{vmatrix} = 27$$

9. Si en la determinante se le intercambian dos filas (o columnas), el determinante cambia de signo.

Ejemplos

$$1. \begin{vmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 1 \Rightarrow \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 5 \end{vmatrix} = -1$$

$$2. \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -6 \Rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 6$$

10.

$$\begin{vmatrix} a_n & b & c \\ d_n & e & f \\ g_n & h & i \end{vmatrix} = n \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d_m & e_m & f_m \\ g & h & i \end{vmatrix} = m \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

Ejemplos

$$1. \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 15 & 1 & 4 \\ 12 & 7 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1.3 & 0 & 1 \\ 5.3 & 1 & 4 \\ 4.3 & 7 & 5 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 4 \\ 4 & 7 & 5 \end{vmatrix}$$

$$2. \begin{vmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 8 & 2 \\ 15 & 5 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 2.3 & 2.4 & 2.1 \\ 5.3 & 5.1 & 5.2 \end{vmatrix} = 2.5 \begin{vmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 3 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

11. $|k \cdot A| = k^n |A|$ k : escalar
 n : orden de la matriz A

Ejemplos

1. Si $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, calcule

⊛ $|3A| = 3^2 |A| = 9 \cdot 5 = 45$

⊛ $|-4A| = (-4)^2 |A| = 16 \cdot 5 = 80$

2. Si la matriz M es de orden 3 y $|M| = 2$, calcule

⊛ $|5M| = 5^3 |M| = 125 \cdot 2 = 250$

⊛ $|-2M| = (-2)^3 |M| = -8 \cdot 2 = -16$

12. $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$

Ejemplos

1. $\left| \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} \right|$

$$= 2.5$$

$$= 10$$

2. $\left| \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 8 & 9 & 1 \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \right| \cdot \left| \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 8 & 9 & 1 \end{bmatrix} \right|$

$$= 12 \cdot 10$$

$$= 120$$

13. $|A^n| = |A|^n$

Ejemplos

1. Si $A = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, calcule

* $|A^2| = |A|^2 = 4^2 = 16$

* $|A^3| = |A|^3 = 4^3 = 64$

2. Si $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 9 & 1 & 0 \\ 4 & 6 & 1 \end{pmatrix}$, calcule

* $|B^3| = |B|^3 = (-1)^3 = -1$

* $|B^6| = |B|^6 = (-1)^6 = 1$

14. Si a una **fila** (o **columna**) se le suma o resta un múltiplo de otra **fila** (o **columna**) respectivamente, el determinante no se altera.

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 7 & 5 & 2 \\ 4 & 9 & 4 \\ 3 & 6 & 3 \end{vmatrix} = \xrightarrow[\text{\textcolor{red}{}C}_2 - 2\text{\textcolor{red}{}C}_3]{\text{\textcolor{red}{}C}_1 - \text{\textcolor{red}{}C}_3} \begin{vmatrix} 7-2 & 5-2 \cdot 2 & 2 \\ 4-4 & 9-2 \cdot 4 & 4 \\ 3-3 & 6-2 \cdot 3 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 15$$

Aplicación

Si se cumple que

$$\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 13 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 & 0 \\ 0 & 15 \end{pmatrix}$$

Calcule $|A|$

- A) 18 B) 30 C) 25 D) 21 E) 20

Resolución:

MATRIZ ADJUNTA

Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

La adjunta de A se denota y será:

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}^T$$

Donde

$$A_{ij} = \begin{cases} |M_{ij}| & ; i + j \text{ es PAR} \\ -|M_{ij}| & ; i + j \text{ es IMPAR} \end{cases}$$

$|M_{ij}|$: Determinante de orden $(n - 1)$ obtenida de A eliminando la fila i y la columna j .

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 7 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}^T$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{23} = - \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2$$

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2$$

$$A_{32} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} = -3$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 7 \end{vmatrix} = 9$$

$$A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\Rightarrow \text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & -3 & 9 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ -2 & -2 & 9 \end{pmatrix}$$

MATRIZ INVERSA

Matriz singular

Decimos que la matriz A es singular si:

$$|A| = 0$$

Ejemplos

1. $A = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = 0$

2. $B = \begin{pmatrix} 7 & \pi & 8 \\ 0 & 0 & 0 \\ 9 & -4 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow |B| = 0$

3. $C = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow |C| = 0$

La matriz C es una **matriz NO singular**.

Definición de matriz inversa

Sea la matriz cuadrada A NO singular, la inversa de A se denota como A^{-1} y se define:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

CÁLCULO DE LA INVERSA

Para matriz de orden 1

$$\text{Si } A = (a) \Rightarrow A^{-1} = \left(\frac{1}{a} \right)$$

Ejemplos

1. $A = (6) \Rightarrow A^{-1} = \left(\frac{1}{6} \right)$

2. $B = \left(\frac{1}{5} \right) \Rightarrow B^{-1} = (5)$

Para matriz de orden 2

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 9 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -9 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & -1 \\ -\frac{9}{2} & 2 \end{pmatrix}$$

Para matriz de orden ≥ 3

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A)}{|A|}$$

Aplicación

Halle la suma de elementos de la matriz inversa de

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 7 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- A) -12 B) -10 C) 5 D) 1 E) 2

Resolución:

PROPIEDADES DE LA INVERSA

$$1. (A^{-1})^{-1} = A$$

$$2. (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$3. (A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$$

$$4. (\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1} \quad \lambda : \text{escalar}$$

$$5. (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

$$6. |A^{-1}| = |A|^{-1} = \frac{1}{|A|}$$

PROPIEDADES DE LA ADJUNTA

$$1. \text{Adj}(A^{-1}) = \text{Adj}(A)^{-1}$$

$$2. \text{Adj}(A^T) = [\text{Adj}(A)]^T$$

$$3. \text{Adj}(A^n) = [\text{Adj}(A)]^n$$

$$4. \text{Adj}(\lambda A) = \lambda^{n-1} \text{Adj}(A) \quad \begin{array}{l} \lambda : \text{escalar} \\ n : \text{orden} \end{array}$$

$$5. \text{Adj}(A \cdot B) = \text{Adj}(B) \cdot \text{Adj}(A)$$

$$6. |\text{Adj}(A)| = |A|^{n-1} \quad n : \text{orden}$$



GRACIAS

SÍGUENOS:   

academiacesarvallejo.edu.pe